

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MANG YANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: / UBND-TTĐVNN.

Mang Yang, ngày tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường công tác chỉ đạo
phòng trừ sâu bệnh cuối vụ
Đông xuân 2019-2020

Kính gửi :

- UBND các xã, thị trấn;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;
- Phòng nông nghiệp và PTNT;
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao.

Thực hiện thông báo số 387/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai.

Để giúp cho bà con nông dân thực hiện tốt việc chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2019 – 2020 theo đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế được những thất thoát mùa màng do dịch hại gây ra. UBND huyện đề nghị các địa phương cần hướng dẫn, chỉ đạo các thôn làng một số nội dung sau:

1. Trên cây Lúa

Tuyên truyền vận động nông dân ứng dụng rộng rãi chương trình IPM, ICM vào sản xuất. Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Bón phân đúng thời kỳ, đầy đủ cân đối N,P, K không bón quá nhiều lượng đạm.

Đối với sâu keo, sâu cuốn lá: Những diện tích lúa gây hại nhẹ thì tiến hành phòng trừ bằng các biện pháp thủ công như kết hợp bắt sâu lúc làm cỏ, tia dặm lúa, ngắt ổ trứng. Với những ruộng bị nhiễm với mật độ cao sử dụng thuốc: *Ofatox 400EC*, *Sherpa 20EC*, *Padan 95SP* ...nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.

Những diện tích bị bệnh đốm nâu, vàng lá sinh lý phun phân bón qua lá như: Atonik, Yogen và bón bổ sung 3 – 4 kg DAP hoặc 2 – 3kg Geno Super /sào.

Bệnh khô vằn sẽ xuất hiện gây hại trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, cần thăm đồng phát hiện sớm xử lý kịp thời bằng các thuốc như: *Validacine 5L*, *Tilt super 300ND*, *Anvil 5SC*...nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.

2. Trên Cây cà Phê

- Thường xuyên vệ sinh vườn cà phê như cắt tỉa cành bị sâu bệnh, chồi vượt, cành tăm, cành vô hiệu trong tán, cành sát mặt đất nhằm mục đích tạo độ thông thoáng, giảm tiêu hao dinh dưỡng, hạn chế sự phát sinh gây hại của sâu bệnh. Tưới nước, tủ gốc cho cây trong mùa khô.

- Điều tra định kỳ để phát hiện sự xuất hiện, mật số của rệp sáp từ đó chủ động phòng trừ sớm, kịp thời khi rệp tuổi nhỏ, mật độ thấp; những vườn rệp sáp xuất hiện với mật độ cao kết hợp tưới nước tiến hành phun xịt làm rụng cánh bông khô, phá tan lớp sáp để khi phun thuốc dễ thấm sâu vào chùm quả, có thể sử dụng các thuốc BVTV như: *Nurelle-D 25/2.5EC*, *Marshal 200SC*, *Subatox 75EC*, *Dimenate 40EC*, *Nitox 30EC*, *Mapjudo 40WP*... Nồng độ theo khuyến cáo trên bao bì.

- Đối với những diện tích đất chuẩn bị trồng tái canh cần cày sâu phơi ải đất, thiết kế lô, xử lý hố trồng, chuẩn bị cây giống đảm bảo trước khi đi vào trồng mới.

3. Trên cây hồ tiêu

- Đối với các vườn cây hồ tiêu đã bị chết, hướng dẫn nông dân thu gom, vệ sinh vườn tiêu, tiêu hủy toàn bộ cây tiêu bị chết; tiến hành cày đất, xử lý đất để tiêu diệt mầm mống sâu, bệnh; chuyển đổi diện tích đất này sang trồng các loại cây khác như cà phê, chanh dây, chuối Nam Mỹ, bơ, sầu riêng và các loại rau, hoa, quả khác có hiệu quả kinh tế, có thị trường tiêu thụ ổn định.

- Những diện tích hiện còn sống: khuyến cáo nông dân không bỏ vườn, tiếp tục chăm sóc những diện tích còn lại theo hướng phát triển sản xuất cây hồ tiêu bền vững: Củng cố đai rừng chắn gió, chăm sóc cây che bóng, không rong rĩa cây choái sống để che nắng; cắt tỉa cành, tủ gốc, xiết nước sau thu hoạch... . Sử dụng phân bón theo hướng cân bằng dinh dưỡng, ứng dụng công nghệ sinh học để phòng trừ rệp sáp, tuyến trùng, bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu; sử dụng công nghệ tiết kiệm nước.

- Kiểm tra diễn biến của tuyến trùng gây hại rễ sau khi thu hoạch, nếu thấy rễ có nhiều nốt u sần cần xử lý thuốc phòng trừ tuyến trùng đã được cơ quan chuyên môn khuyến cáo trước khi bước vào thời kỳ xiết nước; có thể sử dụng các loại thuốc *Solvigo 108 SC*, *Tervigo 020 SC*, *Landsaver 18 EC* kết hợp với thuốc trừ bệnh *Ridomil gold 68 WP*, *Mataxyl 500 W*, liều dùng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

4. Trên cây Mỳ

- Những diện tích sản trồng vụ Mùa 2019 : Vận động người nông dân thu hoạch nhanh gọn, khuyến cáo không được lấy hom giống bị nhiễm sâu bệnh để làm giống, chỉ sử dụng hom giống khỏe mạnh, không nhạt mắt, không bị trầy xước, có từ 8 – 10 tháng tuổi, và đường kính thân 1,5 – 2cm.

+ Phải bảo quản hom giống ở những nơi thích hợp, râm mát hoặc có che nắng, dựng thành bó. Thường xuyên kiểm tra hom giống, nếu phát hiện có nhiễm rệp sáp bột hồng cần phải xử lý ngay.

+ Những trường hợp gây hại rải rác xử lý bằng cách dùng vòi nước mạnh xịt trực tiếp vào hom giống sau đó sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun hoặc nhúng cả cây hom giống trực tiếp vào dung dịch nước thuốc đã pha khoảng 30 phút. Sử dụng bằng các loại thuốc như: Marshal 200SC, Nurelled 25/2.5EC, Opride 20WP...Nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.

+ Những trường hợp bị rệp sáp bột hồng gây hại nặng thì tiến hành thu gom toàn bộ cây hom giống mỳ đem đốt để tiêu hủy.

- Những diện tích sẵn trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 (2-3 tháng tuổi): Tiến hành bón phân đầy đủ, cân đối. Thường xuyên thăm vườn để phát hiện sâu bệnh và xử lý kịp thời.

Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TTDVNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH